



# Echelle de Douleur Aiguë chez le Chien

Propriétaire :

Animal :

Date :


Heure :

Remplir la grille uniquement si l'animal est conscient

L'animal dort ou est inconscient mais peut être réveillé – non évaluable pour la douleur.

L'animal ne peut pas être réveillé, vérifier les signes vitaux, évaluer la thérapie.

Pain Score	PSYCHOLOGIE ET COMPORTEMENT	REPONSE A LA PALPATION	TENSION CORPORELLE
0	<input type="checkbox"/> Confortable au repos <input type="checkbox"/> Joyeux et alerte <input type="checkbox"/> Ne s'occupe pas de sa plaie et du site chirurgical <input type="checkbox"/> Intéressé ou curieux par rapport à l'environnement	<input type="checkbox"/> Pas de réaction - à la palpation de la blessure ou du site chirurgical - à la manipulation	Minimale
1	<input type="checkbox"/> Légèrement instable ou agité <input type="checkbox"/> Facilement distrait par son environnement	<input type="checkbox"/> Réagit à la palpation de la blessure, du site chirurgical, ou des autres parties du corps en regardant autour de lui en tressillant en gémissant	Légère
2	<input type="checkbox"/> Semble inconfortable au repos <input type="checkbox"/> Gémit ou pleure Se lèche ou frotte sa plaie ou le site chirurgical lorsqu'il est laissé sans surveillance <input type="checkbox"/> Oreilles tombantes, expression faciale inquiète (sourcils en accent circonflexe, yeux froncés) <input type="checkbox"/> Réticent à répondre quand on l'appelle <input type="checkbox"/> Pas enthousiaste à interagir avec les gens et l'environnement mais regarde autour de lui pour voir ce qu'il se passe	<input type="checkbox"/> Tressaille, gémit, pleure, surveille sa blessure ou se retire lors de la palpation	Légère à modérée <b>Reconsidérer le protocole analgésique</b>
3	<input type="checkbox"/> Agité, grognon, pleure, mordille ou mord la plaie quand il n'est pas surveillé <input type="checkbox"/> Surveille et protège la plaie ou le site chirurgical en modifiant la distribution de son poids (ex : en boitant ou en changeant constamment de position) <input type="checkbox"/> Réticent à bouger tout ou une partie de son corps	<input type="checkbox"/> La réaction est subtile (mouvement des yeux ou FR augmentée) si le chien est trop douloureux pour bouger ou si il est stoïque <input type="checkbox"/> La réaction est dramatique vocalises grognements morsures retrait ou fuite	Modérée <b>Reconsidérer le protocole analgésique</b>
4	<input type="checkbox"/> Constamment en train de gémir ou de crier quand il n'est pas surveillé <input type="checkbox"/> Mordille ou mord la blessure, mais ne bouge pas beaucoup <input type="checkbox"/> Ne répond pas ou très peu à son environnement <input type="checkbox"/> Difficile de le détourner de la douleur	<input type="checkbox"/> Pleure même à la palpation non douloureuse situation d'allodynie ou de peur que la douleur empire <input type="checkbox"/> Réagit de manière agressive à la palpation	Modérée à sévère <b>Peut être rigide pour éviter les mouvements douloureux</b> <b>Reconsidérer le protocole analgésique</b>




RIGHT

○ Sensibilité à la palpation

× Chaleur

■ Tension



LEFT