

Un gel de budésone

Mode opératoire

FICHE DE FABRICATION		Cachet de la pharmacie 		Nom et signature de l'exécutant : Vanessa	
Date de réalisation de la préparation : date du jour	Date limite d'utilisation (ou de péremption) : date + 1 mois	Numéro de lot de la préparation : 2566848	Quantité ou volume à préparer : 360 ml	Nombre d'unités conditionnées : -	Forme pharmaceutique : Gel liquide complexe
Numéros de lot des MP	Formule réalisée : désignation des produits	Quantité pesée ou volume mesuré pour la préparation	Visa du double contrôle des pesées	Conditionnement	
0901020T	Budésone (pour gel oral)	0,09 g		Conditionnement primaire : flacon souple ambré 500 ml. Conditionnement secondaire : boîte carton + pipette.	
29080	Gomme xanthane	7,2 g			
0800302/C	Sodium saccharinate	0,27 g			
548763/A	Stévia poudre	0,27 g			
XCF43	Sodium benzoate	0,675 g			
65RTFD34	Glycérine	32,4 g			
JHUY764	Sodium edetate	0,36 g			
GFTR52A	Arôme banane	0,36 g			
9876TYG	Eau purifiée	QSP 360 ml			
Le logiciel transforme de façon automatique les quantités saisies en volume en quantités à peser au moment de la fabrication. Calcul : en l'absence de matière première, on utilise la spécialité en ampoule 1 mg/2 ml. Ici, il faudra 90 ampoules de budésone.		Protocole de fabrication 1 Pesée du produit avec enregistrement des numéros de lot de matières premières et des quantités pour la traçabilité dans le respect des BPP. Pesées effectuées dans un gobelet transparent à usage unique. 2 Faire gonfler la gomme xanthane dans l'eau chauffée au bain-marie. 3 Mélanger avec un fouet jusqu'à avoir une consistance parfaitement lisse. 4 Ajouter les poudres, puis l'arôme, puis la glycérine en mélangeant. 5 Ajouter le budésone à la fin. 6 Étiqueter.		Coller le double de l'étiquetage :  COORDONNÉES PHARMACIE Liquide complexe n° 1234543 Voie orale - Lot n° 2466848 Posologie : 1 mg matin, midi et soir - DLU : date + 1 mois Dosage en PA : Budésone 0,03 % - 0,09 g Gomme xanthane 2 % - 7,2 g Sodium saccharinate 0,08 % - 0,27 g Stévia poudre 0,08 % - 0,27 g Sodium benzoate 0,19 % - 0,675 g Glycérine EEN 32,4 g - Sodium edetate 0,1 % - 0,36 g Arôme banane 0,1 % - 0,36 g - Eau purifiée qsp 360 ml UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE RESPECTER LES DOSES PRESCRITES Date : du jour Nom et signature du pharmacien responsable du préparatoire : Christine Pilon <input checked="" type="checkbox"/> Acceptation <input type="checkbox"/> Refus	



© Philippe Matsas. Reportage réalisé à la pharmacie Delpech, Paris.



la prép

Prescription

- Faire préparer un gel de budésone avec :
 - › 25 mg / 100 ml dans de la gomme xanthane.
- Posologie : 1 mg matin, midi et soir.

Indication thérapeutique

La prescription émane d'un service d'hépatogastro-entérologie et cancérologie digestive hospitalier. Le gel de budésone est utilisé dans le traitement de l'œsophagite à éosinophiles, une maladie chronique nécessitant une prise en charge à long terme. Son diagnostic, difficile, doit être différencié du reflux gastro-œsophagien. Elle est associée à une hypersensibilité à un large éventail d'allergènes, surtout alimentaires. Les recommandations de traitement comprennent un inhibiteur de la pompe à protons (IPP), dans un but anti-inflammatoire, combiné à des stéroïdes topiques. Le budésone est un glucocorticoïde de synthèse doté d'un effet anti-inflammatoire local puissant.

Points forts de la préparation

Les formes inhalées sont également prescrites mais la galénique gel permet de tapisser l'œsophage, d'augmenter le temps de contact avec le principe actif, et donc de potentialiser les effets.

Remboursement : oui. ■

Christel Leclercq



www.porphyre.fr > Le préparatoire