

# 25x-NBOMe

Classe di sostanze appartenenti alle NPS (Nuove Sostanze Psichedeliche).

La serie 25x-NBOMe, conosciute anche come N-BOMB, sono fenetilamine psichedeliche dagli effetti molto potenti anche a basso dosaggio, derivate delle corrispondenti molecole della famiglia 2C-x (es. 2C-B), questa derivazione causa un forte incremento della potenza e un parziale livellamento delle differenti durate che si riscontrano fra le 2C-x. L'inizio del loro utilizzo coincide con la loro comparsa sul mercato online che risale ad appena il 2010, anche per questo vi sono scarsi dati riguardo i criteri di sicurezza per il loro utilizzo.

## **Info**

### **Forma:**

Generalmente blotter (spesso venduti come LSD, cosa che comporta MOLTI rischi).  
Polvere

### **Modalità di assunzione e durata**

**Sublinguale 8-10 ore**

**NB:** vanno tenuti in bocca per almeno una ventina di minuti per permettere il pieno assorbimento della sostanza, in quanto diversamente dall'LSD se ingoiati il principio attivo viene metabolizzato e distrutto a livello dello stomaco.

**Sniffato 4-6 ore**

I side effects possono durare per molto tempo anche 24 ore.

### **Dosaggio:**

Il dosaggio dipende dalle caratteristiche della persona, dal peso e dalla modalità di assunzione.

Inizia sempre con un basso dosaggio, specialmente se è la tua prima volta!

Nonostante gli effetti siano relativamente simili fra le varianti della serie vi sono alcune differenze specialmente in termini di durata e potenza e quindi del dosaggio.

Informati bene e dosa accuratamente nel modo più preciso possibile.

### **Effetti:**

**Ricercati:** intense alterazioni della percezione visiva, allucinazioni ad occhi chiusi, aumento delle sensazioni tattili, formicolii elettrizzanti lungo tutto il corpo, rush di euforia, effetto stimolante ed energetico molto marcato, a dosi basse sensazione di aumentate capacità cognitive di analisi, ragionamento e comprensione

Collaterali: stati di paura, confusione mentale, amnesie, distorsione di spazio e tempo  
Effetti fisici: tremori, bruxismo, nausea, tachicardia, aumento della pressione, vasocostrizione, aumento della temperatura corporea, contrazioni e crampi muscolari

### **Rischi:**

La serie 25x-NBOMe risulta essere molto più pericolosa e difficile da gestire rispetto agli psichedelici classici.

Sono riportati numerosi casi di effetti dose indipendenti, ossia l'assunzione in diverse occasioni della medesima quantità di sostanza ha portato inaspettatamente a effetti di intensità drasticamente differente. Questa **imprevedibilità** aumenta notevolmente il rischio associato all'utilizzo di queste sostanze.

Sono riportati svariati casi di ospedalizzazioni causate da overdosi da NBOMe e diversi decessi sono stati collegati agli effetti tossici di questa sostanza. L'intensa vasocostrizione causata da queste sostanze sembra essere collegata alle morti e ad altri danni fisici (diverse sono state le amputazioni necessarie a causa della necrosi agli arti).

È fortemente **sconsigliata l'assunzione per via nasale** data la bassa quantità di sostanza necessaria con la conseguente alta probabilità di assumerne in eccesso e finire in overdose (potenzialmente mortale).

Esiste il rischio di innescare **crisi epilettiche**, in particolar modo in soggetti predisposti o che assumono psicofarmaci.

### **Mix da evitare**

**Litio**: psicofarmaco usato generalmente nel trattamento del disturbo bipolare, aumenta il rischio di innescare crisi epilettiche;

**Tramadol**: oppioide sintetico, abbassa la soglia per l'innescamento di crisi epilettiche,

**Sostanze che in associazione aumentano il rischio di intossicazione da serotonina (effetti pericolosi e potenzialmente fatali)**

**MAO inibitori**: ruta siriana, banisteriopsis caapi, 2C-T-2, 2C-T-7, αMT, antidepressivi IMAO;

**Sostanze che aumentano il rilascio di serotonina**: MDMA, 4-FA, αMT;

**Psicofarmaci**: delle categorie SSRI (es. Prozac, Zoloft, Seropram etc.) e SNRI (Efexor, Cymbalta etc.);

### **Safer use:**

- Dosa attentamente e se possibile fai analizzare la sostanza
- La modalità di assorbimento sublinguale causa il conseguente intorpidimento della lingua e porta con sé il gusto metallico-sintetico-amaro caratteristico di queste sostanze (utile per riconoscere se il blotter è stato venduto come LSD, in quanto questa è praticamente insapore)
- Comincia **SEMPRE** dal dosaggio minimo indicato. Dosi elevate possono portare a esperienze spiacevoli e pericolose..
- Sniffare può essere pericoloso perché le sostanze 25x-NBOMe sono difficili da dosare. Se sniffi, usa le regole del safer sniffing.

- Se hai assunto queste sostanze non guidare! utilizza i mezzi pubblici, prendi un taxi o vai a piedi.
- Se l'esperienza si rivela troppo intensa e sopraffacente il consiglio è lasciar fluire le sensazioni. Cercare di controllarle è fondamentalmente una partita persa, lasciare il controllo è la sola via per attraversare momenti intensi e impegnativi.
- In caso di necessità recati nella zona chill out e dagli operatori della riduzione del danno. Se non sono presenti, chiama il 112. Comunica sempre cosa e quanto (se lo sai) la persona che sta male ha assunto: questo potrebbe salvargli la vita e non ci sono ripercussioni penali né su di te né sui tuoi amici, tantomeno per chi sta male!
  - Tieni sempre a mente le regole di safe sex

**I rischi del consumo di sostanze psicoattive dipendono sempre della tua persona, dalle tue condizioni di salute attuali e dal tuo ambiente circostante.**



Progetto Neutrael