

# METANFETAMINA

N-metilanfetamina (nota anche come metanfetamina) è una sostanza stimolante ampiamente utilizzata della classe delle anfetamine nota per i suoi effetti potenti e di lunga durata. La metanfetamina cloridrato è approvata dalla Food and Drug Administration (USFDA) degli Stati Uniti con il nome commerciale "Desoxyn". Tuttavia, è raramente prescritto a causa del suo potenziale di abuso, in genere riservato ai casi di obesità grave o ADHD in cui tutte le altre opzioni di trattamento sono state esaurite.

La metanfetamina colpisce principalmente il sistema nervoso centrale (SNC) come agente di rilascio di neurotrasmettitori come dopamina, norepinefrina e serotonina. Agisce anche come inibitore della ricaptazione, aumentando i livelli di monoammine.

## **Info**

### **Forma:**

Pillole (yaba, pillole thai, Pervitin®)  
Cristalli («crystal», «ice», «pico», "shaboo").

### **Modalità di assunzione e durata:**

Fumata: 1-2 ore

Orale: 2-8 ore

Iniettata: 2-4 ore

Sniffata: 1-2 ore

gli effetti secondari possono durare anche 24 ore, soprattutto in caso di assunzione orale

### **Dosaggio:**

5-50mg

Il dosaggio dipende dalle caratteristiche della persona, dalla tolleranza sviluppata, dal peso e dalla modalità di assunzione. Inizia sempre con un basso dosaggio, specialmente se è la tua prima volta!

Informati bene e dosa accuratamente nel modo più preciso possibile, magari con un bilancino.

### **Effetti:**

Ricercati: euforia, aumento dell'attenzione, riduzione della fatica e del bisogno di dormire dell'appetito e aumento del bisogno di parlare, diminuisce la paura, l'ansia e l'insicurezza.

Effetti indesiderati: mal di testa, tachicardia, aumento della pressione, aumento della sudorazione e della temperatura corporea e di conseguenza disidratazione, frequente bisogno di urinare, vista offuscata, bruxismo, difficoltà ad ingerire alimenti e bevande, nausea, vomito e disfunzioni erettile  
spasmi muscolari.

Nei giorni seguenti l'assunzione ci si può sentire stanchi ed affaticati, con difficoltà cognitive e a concentrarsi, si può provare ansia e/o depressione, aumenta l'irritabilità e si può far fatica a dormire (insonnia). Questo è dovuto allo svuotamento repentino dei neurotrasmettitori dopamina e serotonina. Gli effetti del down possono durare circa 12 ore.

#### Rischi:

- Sniffare danneggia le mucose nasali, se ingerita la metanfetamina, rovina le mucose dello stomaco, se fumata aumenta il rischio di cancro ai polmoni.
- A differenza dell'anfetamina, la metanfetamina è direttamente neurotossica per i neuroni della dopamina. Analogamente agli effetti neurotossici sul sistema dopaminergico, la metanfetamina può anche provocare neurotossicità per i neuroni della serotonina.
- a lungo termine i rischi per il fisico sono molti: perdita di peso, infiammazioni della pelle («brufoli da speed»), deterioramento dei denti, dei reni e danni ai polmoni, mal di stomaco e crampi, **nelle donne**, perdita di regolarità o interruzione del ciclo mestruale.
- Il consumo cronico può portare a emorragie cerebrali e ad ictus con conseguenti paralisi. L'utilizzo è inoltre considerato fortemente additivo, rischiando di condurre ad una **dipendenza** dalla sostanza, con conseguente craving nel momento in cui questa non è disponibile.

#### Mix da evitare:

Alcol, GHB/GBL, Oppioidi, Cocaina, Caffaina, Tramadolo, DXM, Ketamina, PCP, Metoxetamina.

**Psichedelici e cannabis** per l'aumento di rischio di crisi d'ansia e paranoia.

**MAOI** - inibitori MAO-B possono accrescere la potenza e la durata delle fenetilammine in modo non prevedibile, inibitori MAO-A possono portare insieme a metanfetamina a crisi ipertensive.

#### Safer use:

- Sniffare provoca danni alle mucose nasali e l'ingestione danneggia quelle dello stomaco.
  - Non sottovalutare il bisogno di dormire e mangiare.
- Se sniffi cambia narice e lavale entrambe per prevenire ferite e irritazioni. Non condividere mai i materiali di assunzione. Condividere materiale di assunzione comporta il rischio di contrarre infezioni. Non condividere il tuo pippotto con nessuno!
- Dopo il consumo mangia per prevenire eventuali perdite di peso. Bevi acqua o bibite isotoniche (ricche di sali minerali) a sufficienza (½ l ogni ora).
- Dopo ogni consumo fai delle pause di alcune settimane per permettere al tuo organismo di riequilibrarsi.
- Se soffri di ipertensione, di malattie del fegato e dei reni o diabete rinuncia al consumo di metanfetamina.

- Dosa attentamente la sostanza con un bilancino e se possibile fai analizzare la sostanza.
- Comincia **SEMPRE** dal dosaggio minimo indicato. Dosi elevate possono portare a esperienze spiacevoli e pericolose.
- Nel caso di acquisti su internet non fare affidamento sulla descrizione del contenuto sull'imballaggio poiché non dà nessuna garanzia sulla vera natura del prodotto all'interno.

Fonti: danno.ch, psychonautwiki, KnowDrugs

**Le sostanze sono frequentemente adulterate. Quotidianamente vengono immesse sul mercato nero Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) che sono molecole create per aggirare lo status illegale delle sostanze tradizionali e mimarne gli effetti. Delle NPS, proprio perché nuove, spesso non si conoscono effetti, rischi e danni.**

**Testa la tua sostanza con un servizio di drug checking prima di usarla!**

**I rischi del consumo di sostanze psicoattive dipendono sempre della tua persona, dalle tue condizioni di salute attuali e dal tuo ambiente circostante.**



Progetto Neutavel