

MDA

3,4-metilenediossianfetamina, empatogeno di origine sintetica

Info:

Si colloca nella categoria degli empatogeni e stimolanti (upper). Agisce incrementando il rilascio di serotonina, noradrenalina e dopamina.

L'MDA è venduto in forma pura o parzialmente dichiarata come nuova sostanza psicoattiva (NSP) o come pasticche di ecstasy in combinazione con l'MDMA.

Si trova sotto forma di cristalli o pastiglie/comprese.

Durata: 2-5 ore, effetti secondari fino a 24 ore

Dosaggio:

Dipende dalle caratteristiche personali e dal contesto in cui si assume.

La dose adeguata varia in base al peso corporeo:

Orale: 40-140mg

Effetti psicoattivi:

L'MDA è simile all'MDMA ma è **più forte a parità di dosaggio**, si differenzia soprattutto nell'effetto entactogeno, nella maggiore capacità di immedesimazione (effetto empatogeno) e per una maggiore intensità degli effetti allucinogeni anche a dosi moderate.

Ricercati: spiccata euforia, accompagnata da benessere generale ed elevata felicità, maggiore desiderio di comunicare, aumento della socialità, diminuzione della paura e dell'ansia, maggiori capacità introspettive, senso di benessere e rilassamento. Aumento dell'energia e dell'empatia, alterazione delle percezioni, maggiore apprezzamento per la musica e delle sensazioni tattili.

Collaterali: all'aumentare del dosaggio aumentano gli effetti collaterali/non ricercati come distorsioni visive e allucinazioni (questo effetto può portare a mettere in atto comportamenti rischiosi).

Fisici: diminuzione dell'appetito, bruxismo, tensione muscolare, mal di testa, sudorazione eccessiva, aumento del battito cardiaco e della pressione del sangue e della temperatura corporea, aumento della glicemia.

Rischi:

Può causare effetti fisici sgradevoli e pericolosi come intorpidimento mandibolare, tremore muscolare, nausea, vomito. Rispetto all'MDMA si presume che l'MDA sia maggiormente

epatotossico (dannoso per il fegato) e neurotossico. Aumentando la temperatura corporea vi è rischio di colpi di calore, soprattutto durante le giornate calde.

Può causare convulsioni (soprattutto se usato con il Tramadolo), ipertermia, disidratazione.

Mix da evitare:

Non assumerla con alcol, farmaci contro l'HIV (combinazioni di farmaci inibitori della proteasi), DMX, Tramadolo, 2-Cx, cocaina, anfetamina, metanfetamina, MAO-inibitori, antidepressivi.

Safer Use:

- Inizia con una dose bassa, soprattutto se è la tua prima volta.
- Se scegli di assumere MDA aspetta almeno un'ora e mezza per capire gli effetti prima di prenderne ancora.
 - Non prendere l'MDA a stomaco vuoto, fai un pasto leggero 2-3 ore prima.
- Rinuncia all'alcol e bevi acqua o bibite isotoniche (ricche di sali minerali) a sufficienza (½ litro ogni ora).
 - Concediti una pausa dal ballo ed evita gli spazi non arieggiati.
 - Tutto quello che sale prima o poi scende! Prenderne altra non permette di raggiungere i medesimi effetti perché il rilascio di serotonina è limitato e la tossicità e gli effetti collaterali aumentano!
 - Tra un'assunzione e l'altra fai pause di almeno 4-6 settimane.
 - Se prendi dei farmaci, informati sulle possibili interazioni.
- È fortemente controindicato il consumo nelle persone che soffrono di malattie cardiache, ipertensione, malattie del fegato o dei reni, ipertiroidismo o problemi circolatori.

Le sostanze sono frequentemente adulterate.

Quotidianamente vengono immesse sul mercato nero Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) che sono molecole create per aggirare lo status illegale delle sostanze tradizionali e mimarne gli effetti. Delle NPS, proprio perché nuove, spesso non si conoscono effetti, rischi e danni.

Testa la tua sostanza con un servizio di drug checking prima di usarla!

I rischi del consumo di sostanze psicoattive dipendono sempre della tua persona, dalle tue condizioni di salute attuali e dal tuo ambiente circostante.

Fonti: danno.ch, psychonautwiki.org, KnowDrugs



Progetto Neuttravel