

ВАКЦИНА «ПФАЙЗЕР» (PFIZER) ОТ ВИРУСА COVID-19 ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 11 ЛЕТ

ЧТО ВАМ НАДО ЗНАТЬ

Пандемия вируса COVID-19 затрагивает всех, в том числе детей. Защитите своих детей от серьезной болезни, уже сегодня сделав им прививку. На данный момент для прививки от COVID-19 детей в возрасте от 5 лет разрешена только вакцина «Пфайзер».



Безопасна ли вакцина?

Да. В испытаниях вакцины участвовали тысячи детей, и её одобрили независимые ученые и агентства. (1)

Может ли мой ребенок во время одного посещения быть привит другими вакцинами?

Да. Одновременно получать разные вакцины – это безопасно.(2)

Есть ли побочные эффекты?

Побочные эффекты обычны и могут включать боль в руке, усталость, головную боль, лихорадку, озноб, а также боль в мышцах или суставах. (3)



Изучитет



Запланируйте



Посетите



Сохраните

- Если у вас есть вопросы, обращайтесь с ними к вашему педиатру.
- Посетите педиатра, поликлинику или аптеку. Убедитесь, что в месте вакцинации есть доза вакцины «Пфайзер» (Pfizer), соответствующая возрасту вашего ребенка.
- **Вакцина бесплатна. Вам не нужна страховка, и вам не надо платить.**
- Возвращайтесь, пожалуйста, в то же место вакцинации через 21 день – для второй дозы прививки для вашего ребенка.
- Сохраните карту вакцинации и принесите её на второй прием.(4)

КАК УТЕШИТЬ РЕБЕНКА В МОМЕНТ ВАКЦИНАЦИИ



- Напомните своему ребёнку, что вакцины сохраняют его здоровье.
- В день приёма поговорите о событиях дня и спланируйте что-нибудь интересное после вакцинации.
- Возьмите с собой утешительные предметы, например книги или игрушки, которые помогут успокоить и отвлечь.
- Попросите своего врача использовать аппликатор для блокировки боли от уколов или обезболивающее – для того, чтобы облегчить дискомфорт.
- Будьте спокойны и позитивны сами. Вы вдохновите своего ребенка делать то же самое.

Узнайте больше по ссылке: www.boostoregon.org/comfort

Что известно о долгосрочных побочных эффектах?

Долгосрочные побочные эффекты от любой вакцины крайне маловероятны, в том числе от вакцины против Covid-19. Испытания вакцины и данные мониторинга показывают, что побочные эффекты обычно возникают в течение 6-и недель после инъекции. Миллионы американцев получили вакцину от вируса Covid-19, и никаких долгосрочных побочных эффектов не выявлено. (5)

Для мужчин в возрасте до 30 лет известен небольшой повышенный риск миокардита в течение 1-й недели после прививки вакцинами «Пфайзер» (Pfizer) или «Модерна» (Moderna). Симптомами могут быть боль в груди, одышка или учащенное нерегулярное сердцебиение. Это случается редко и не вызывает непоправимых последствий. (6)

Если у вашего ребенка развивается аллергическая реакция, то вы узнаете об этом сразу после укола. По этой причине ваш ребенок будет находиться под наблюдением в течение 15-30 минут после вакцинации. (3)



Источники:

1. Western States Scientific Safety Review Workgroup: <https://www.oregon.gov/newsroom/Pages/NewsDetail.aspx?newsid=64527>
2. American Academy of Pediatrics: <https://www.healthychildren.org/English/tips-tools/ask-the-pediatrician/Pages/Can-my-child-get-a-COVID-vaccine-at-the-same-time-they-get-other-immunizations-they-need.aspx?>
3. Allergy and Asthma Network: <https://allergyasthmanetwork.org/news/covid-vaccine-for-children/>
4. American Academy of Pediatrics: <https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Getting-Your-Child-Ready-for-the-COVID-19-Vaccine.aspx>
5. Centers for Disease Control and Prevention: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html>
6. American Academy of Pediatrics: <https://www.healthychildren.org/English/tips-tools/ask-the-pediatrician/Pages/Does-the-COVID-19-vaccine-cause-myocarditis-in-teens-and-young-people.aspx>

Для получения дополнительной информации читайте: www.boostoregon.org